

КОМБИСЕТ® от вредителей и болезней САДА
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БАКОВОЙ СМЕСИ

ПРЕПАРАТ	ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ/ НАЗНАЧЕНИЕ	РАЗВЕДЕНИЕ, л	РАСХОД РАБОЧЕГО РАСТВОРА	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Клотиамет®, 1 г	Все виды насекомых	На 10 л воды	1 – 5 л на одно дерево, в зависимости от объема кроны	Опрыскивание в период вегетации в фазах: «зеленый конус»; «розовый бутон»; Последующие – после цветения с интервалом 10-15 дней
Дискор®, 2 мл	Мучнистая роса, парша, гнили, альтернариоз			
АгроСтимул®, 2 мл	Стимуляция роста, увеличения урожайности и качества продукции			

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БАКОВОЙ СМЕСИ

1. В емкость объемом 10 л налить 5 л воды.
2. Вскрыть упаковку «КЛОТИАМЕТ®», 1 г», открыть ампулу, вылить ее содержимое в воду, тщательно перемешать до полного растворения.
3. Вскрыть упаковку «ДИСКОР®», 2 мл», открыть ампулу, добавить ее содержимое в полученный раствор и размешать до однородного состояния.
4. Вскрыть упаковку «АГРОСТИМУЛ®», 2 мл», открыть ампулу, добавить ее содержимое в полученный раствор и аккуратно размешать до однородного состояния.
5. В емкость с полученным раствором добавить воды до полного объема (10 л) и еще раз тщательно размешать до однородного состояния. Раствор готов к применению. Использовать для обработки плодовых деревьев согласно рекомендациям по использованию баковой смеси.

ЗАПРЕЩЕНО СМЕШИВАТЬ КОМПОНЕНТЫ ДАННОЙ БАКОВОЙ СМЕСИ В ДРУГОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ!

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ



Налить 5 л воды



Вскрыть **КЛОТИАМЕТ®**, добавить в воду, тщательно перемешать



Вскрыть **ДИСКОР®**, добавить в раствор, тщательно перемешать



Вскрыть **АГРОСТИМУЛ®**, добавить в раствор, тщательно перемешать



Добавить воды до объема 10 л, тщательно перемешать, опрыскать растения

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ОБРАБОТКЕ БАКОВЫМИ СМЕСЯМИ

- Готовую баковую смесь следует использовать в день ее приготовления
- Обработку нужно проводить в ясную безветренную погоду при температуре от +15 до +25 °С
- Обработки проводить ранним утром или поздним вечером
- Использовать мягкую чистую воду с нейтральным pH и температурой не менее +10 °С

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- Проводить обработку при температуре воздуха выше +25 °С
- Обрабатывать ослабленные растения

Для достижения наилучшего результата рекомендуем применять баковую смесь четыре раза за период вегетации

Заказчик	Агрусхим-Алабуга	№ макета	14-25-05-26
Название	Инструкция Комбисет Сад		
Обрезной формат	148x200		
Схема фальцовки №	23	Подготовил(а) макет	Евгения Приц
Согласовано и Утверждено			
Менеджер: Бойцова Лилия		Дата: 25.05.2026	
Заказчик:			
Внимание! Подпись заказчика под данным оригинал-макетом означает, что заказчик согласен с общим видом, текстом, размером, ориентацией. После утверждения заказчиком оригинал-макета типография не несет ответственности за грамматические и другие ошибки, которые могут присутствовать в оригинал-макете и отпечатанном тираже.			
ПРИМЕЧАНИЕ:			

КРАСОЧНОСТЬ (допуск по цвету ΔE ≤ 3, ISO 12647-2:2004)	СХЕМА ФАЛЬЦОВКИ
	Схема фальцовки на странице 2
ДАННАЯ РАСПЕЧАТКА	
 НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЦВЕТОПРОБой	

1^й фальц
148×200 —> 148×100

2^й фальц
148×100 —> 74×100

КОМБИСЕТ® от вредителей и болезней САДА
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БАКОВОЙ СМЕСИ

ПРЕПАРАТ	ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ/ НАЗНАЧЕНИЕ	РАЗВЕДЕНИЕ, л	РАСХОД РАБОЧЕГО РАСТВОРА	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Клотиамет®, 1 г	Все виды насекомых	На 10 л воды	1 – 5 л на одно дерево, в зависимости от объема кроны	Опрыскивание в период вегетации в фазы: «зеленый конус» «розовый бутон»; Последующие – после цветения с интервалом 10-15 дней
Дискор®, 2 мл	Мучнистая роса, парша, гнили, альтернариоз			
АгроСтимул®, 2 мл	Стимуляция роста, увеличения урожайности и качества продукции			

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БАКОВОЙ СМЕСИ
1. В емкость объемом 10 л налить 5 л воды.
2. Вскрыть упаковку «КЛОТИАМЕТ®», 1 г, открыть ампулу, вылить ее содержимое в воду, тщательно перемешать до полного растворения.
3. Вскрыть упаковку «ДИСКОР®», 2 мл, открыть ампулу, добавить ее содержимое в полученный раствор и размешать до однородного состояния.
4. Вскрыть упаковку «АГРОСТИМУЛ®», 2 мл, открыть ампулу, добавить ее содержимое в полученный раствор и аккуратно размешать до однородного состояния.
5. В емкость с полученным раствором добавить воды до полного объема (10 л) и еще раз тщательно размешать до однородного состояния. Раствор готов к применению. Использовать для обработки плодовых деревьев согласно рекомендациям по использованию баковой смеси.

ЗАПРЕЩЕНО СМЕШИВАТЬ КОМПОНЕНТЫ ДАННОЙ БАКОВОЙ СМЕСИ В ДРУГОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ!

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ



Налить 5 л воды
Вскрыть КЛОТИАМЕТ®, добавить в воду, тщательно перемешать
Вскрыть ДИСКОР®, добавить в раствор, тщательно перемешать
Вскрыть АГРОСТИМУЛ®, добавить в раствор, тщательно перемешать
Добавить воды до объема 10 л, тщательно перемешать, опрыскать растения

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ОБРАБОТКЕ БАКОВЫМИ СМЕСЯМИ
■ Готовую баковую смесь следует использовать в день ее приготовления
■ Обработку нужно проводить в ясную безветренную погоду при температуре от +15 до +25 °С
■ Обработки проводить ранним утром или поздним вечером
■ Использовать мягкую чистую воду с нейтральным pH и температурой не менее +10 °С

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
■ Проводить обработку при температуре воздуха выше +25 °С
■ Обрабатывать ослабленные растения
Для достижения наилучшего результата рекомендуем применять баковую смесь четыре раза за период вегетации

КОМБИСЕТ® от вредителей и болезней САДА
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БАКОВОЙ СМЕСИ

ПРЕПАРАТ	ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ/ НАЗНАЧЕНИЕ	РАЗВЕДЕНИЕ, л	РАСХОД РАБОЧЕГО РАСТВОРА	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Клотиамет®, 1 г	Все виды насекомых	На 10 л воды	1 – 5 л на одно дерево, в зависимости от объема кроны	Опрыскивание в период вегетации в фазы: «зеленый конус» «розовый бутон»; Последующие – после цветения с интервалом 10-15 дней
Дискор®, 2 мл	Мучнистая роса, парша, гнили, альтернариоз			
АгроСтимул®, 2 мл	Стимуляция роста, увеличения урожайности и качества продукции			

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БАКОВОЙ СМЕСИ
1. В емкость объемом 10 л налить 5 л воды.
2. Вскрыть упаковку «КЛОТИАМЕТ®», 1 г, открыть ампулу, вылить ее содержимое в воду, тщательно перемешать до полного растворения.
3. Вскрыть упаковку «ДИСКОР®», 2 мл, открыть ампулу, добавить ее содержимое в полученный раствор и размешать до однородного состояния.
4. Вскрыть упаковку «АГРОСТИМУЛ®», 2 мл, открыть ампулу, добавить ее содержимое в полученный раствор и аккуратно размешать до однородного состояния.
5. В емкость с полученным раствором добавить воды до полного объема (10 л) и еще раз тщательно размешать до однородного состояния. Раствор готов к применению. Использовать для обработки плодовых деревьев согласно рекомендациям по использованию баковой смеси.

ЗАПРЕЩЕНО СМЕШИВАТЬ КОМПОНЕНТЫ ДАННОЙ БАКОВОЙ СМЕСИ

Финальный размер
74×100 мм

КОМБИСЕТ® от вредителей и болезней САДА
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БАКОВОЙ СМЕСИ

ПРЕПАРАТ	ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ/ НАЗНАЧЕНИЕ	РАЗВЕДЕНИЕ, л
Клотиамет®, 1 г	Все виды насекомых	На 10 л воды
Дискор®, 2 мл	Мучнистая роса, парша, гнили, альтернариоз	
АгроСтимул®, 2 мл	Стимуляция роста, увеличения урожайности и качества продукции	

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БАКОВОЙ СМЕСИ
1. В емкость объемом 10 л налить 5 л воды.
2. Вскрыть упаковку «КЛОТИАМЕТ®», 1 г, открыть ампулу, вылить ее содержимое в воду, тщательно перемешать до полного растворения.
3. Вскрыть упаковку «ДИСКОР®», 2 мл, открыть ампулу, добавить ее содержимое в полученный раствор и размешать до однородного состояния.
4. Вскрыть упаковку «АГРОСТИМУЛ®», 2 мл, открыть ампулу, добавить ее содержимое в полученный раствор и аккуратно размешать до однородного состояния.
5. В емкость с полученным раствором добавить воды до полного объема (10 л) и еще раз тщательно размешать до однородного состояния. Раствор готов к применению. Использовать для обработки плодовых деревьев согласно рекомендациям по использованию баковой смеси.

ЗАПРЕЩЕНО СМЕШИВАТЬ КОМПОНЕНТЫ ДАННОЙ БАКОВОЙ СМЕСИ

Заказчик

Агрусхим-Алабуга

№ макета

14-25-05-26

Название

Инструкция Комбисет Сад

Обрезной формат

148x200

Схема фальцовки №

23

Подготовил(а) макет

Евгения Приц

Согласовано и Утверждено

Подпись

Дата

Менеджер:

Бойцова Лилия

25.05.2026

Заказчик:

Внимание! Подпись заказчика под данным оригинал-макетом означает, что заказчик согласен с общим видом, текстом, размером, ориентацией. После утверждения заказчиком оригинал-макета типография не несет ответственности за грамматические и другие ошибки, которые могут присутствовать в оригинал-макете и отпечатанном тираже.

ПРИМЕЧАНИЕ:

КРАСОЧНОСТЬ
(допуск по цвету ΔE ≤ 3, ISO 12647-2:2004)

Биговка

Высечка

ДАННАЯ РАСПЕЧАТКА



НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЦВЕТОПРОБой

СХЕМА ФАЛЬЦОВКИ

Схема фальцовки