

КОМБИСЕТ® от вредителей и болезней на ЯГОДАХ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БАКОВОЙ СМЕСИ

ПРЕПАРАТ	ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ/ НАЗНАЧЕНИЕ	РАЗВЕДЕНИЕ, л	РАСХОД РАБОЧЕГО РАСТВОРА	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Имиприд®, 5 мл	Тля, трипсы	На 10 л воды	На 100 м²	Опрыскивание в период вегетации до цветения и после сборки урожа Интервал между обработками 14 дней
Профи®, 5 мл	Пятнистости, мучнистая роса, ржавчина, антракноз			
АгроСтимул®, 2 мл	Ускорение наступления биологической и техноло- гической зрелости; увеличение урожайности и качества продукции			

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БАКОВОЙ СМЕСИ

- В емкость объемом 10 л налить 5 л воды.
 - Вскрыть упаковку «ИМИПРИД®, 5 мл», открыть ампулу, вылить ее содержимое в воду, тщательно перемешать до полного растворения.
 - Вскрыть упаковку «ПРОФИ®, 5 мл», открыть ампулу, добавить концентрат эмульсии в полученный раствор и размешать до однородного состояния.
 - Вскрыть упаковку «АГРОСТИМУЛ®, 2 мл», открыть ампулу, добавить ее содержимое в полученный раствор и аккуратно размешать до однородного состояния.
 - В емкость с полученным раствором добавить воды до полного объема (10 л) и еще раз тщательно размешать до однородного состояния.
- Раствор готов к применению. Использовать для обработки цветочных и декоративных культур согласно рекомендациям по использованию баковой смеси.

**ЗАПРЕЩЕНО СМЕШИВАТЬ КОМПОНЕНТЫ ДАННОЙ БАКОВОЙ СМЕСИ
В ДРУГОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ!**

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ



Налить 5 л
воды



Вскрыть **ИМИПРИД®**,
добавить в воду,
тщательно перемешать



Вскрыть **ПРОФИ®**,
добавить в раствор,
тщательно перемешать



Вскрыть **АГРОСТИМУЛ®**,
добавить в раствор,
тщательно перемешать



Добавить воды
до объема 10 л,
тщательно перемешать,
опрыскать растения

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ОБРАБОТКЕ БАКОВЫМИ СМЕСЯМИ

- Готовую баковую смесь следует использовать в день ее приготовления
- Обработку нужно проводить в ясную безветренную погоду при температуре от +15 до +25 °C
- Обработки проводить ранним утром или поздним вечером
- Использовать мягкую чистую воду с нейтральным pH и температурой не менее +10 °C

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- Проводить обработку при температуре воздуха выше +25 °C
 - Оббатывать ослабленные растения
- Для достижения наилучшего результата рекомендуем применять баковую смесь четыре раза за период вегетации

Заказчик: Агрусхим-Алабуга	№ макета: 16-25-05-26	КРАСОЧНОСТЬ (допуск по цвету ΔE ≤ 3, ISO 12647-2:2004)	СХЕМА ФАЛЬЦОВКИ
Название: Инструкция Комбисет Ягоды		Black	
Обрезной формат: 148x200			
Схема фальцовки № 23	Подготовил(а) макет: Евгения Приц		
Согласовано и Утверждено	Подпись	Дата	Схема фальцовки на странице 2
Менеджер: Бойцова Лилия		25.05.2026	
Заказчик:			
Внимание! Подпись заказчика под данным оригинал-макетом означает, что заказчик согласен с общим видом, текстом, размером, ориентацией. После утверждения заказчиком оригинал-макета типография не несет ответственности за грамматические и другие ошибки, которые могут присутствовать в оригинал-макете и отпечатанном тираже.			
ПРИМЕЧАНИЕ:			
ДАННАЯ РАСПЕЧАТКА  НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЦВЕТОПРОБой			

1^й фальц
148×200 —> 148×100

2^й фальц
148×100 —> 74×100

КОМБИСЕТ® от вредителей и болезней на ЯГОДАХ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БАКОВОЙ СМЕСИ

ПРЕПАРАТ	ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ/ НАЗНАЧЕНИЕ	РАЗВЕДЕНИЕ, л	РАСХОД РАБОЧЕГО РАСТВОРА	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Имиприд®, 5 мл	Тля, трипсы	На 10 л воды	На 100 м²	Опрыскивание в период вегетации до цветения и после сборки урожая Интервал между обработками 14 дней
Профи®, 5 мл	Пятнистости, мучнистая роса, ржавчина, антракноз			
АгроСтимул®, 2 мл	Ускорение наступления биологической зрелости; увеличение урожайности и качества продукции			

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БАКОВОЙ СМЕСИ

1. В емкость объемом 10 л налить 5 л воды.
2. Вскрыть упаковку «ИМИПРИД®», 5 мл, открыть ампулу, вылить ее содержимое в воду, тщательно перемешать до полного растворения.
3. Вскрыть упаковку «ПРОФИ®», 5 мл, открыть ампулу, добавить концентрат эмульсии в полученный раствор и размешать до однородного состояния.
4. Вскрыть упаковку «АГРОСТИМУЛ®», 2 мл, открыть ампулу, добавить ее содержимое в полученный раствор и аккуратно размешать до однородного состояния.
5. В емкость с полученным раствором добавить воды до полного объема (10 л) и еще раз тщательно размешать до однородного состояния.
Раствор готов к применению. Использовать для обработки цветочных и декоративных культур согласно рекомендациям по использованию баковой смеси.

ЗАПРЕЩЕНО СМЕШИВАТЬ КОМПОНЕНТЫ ДАННОЙ БАКОВОЙ СМЕСИ В ДРУГОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ!

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ



Налить 5 л воды



Вскрыть **ИМИПРИД®**, добавить в воду, тщательно перемешать



Вскрыть **ПРОФИ®**, добавить в раствор, тщательно перемешать



Вскрыть **АГРОСТИМУЛ®**, добавить в раствор, тщательно перемешать



Добавить воды до объема 10 л, тщательно перемешать, опрыскать растения

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ОБРАБОТКЕ БАКОВЫМИ СМЕСЯМИ

- Готовую баковую смесь следует использовать в день ее приготовления
- Обработку нужно проводить в ясную безветренную погоду при температуре от +15 до +25 °C
- Обработки проводить ранним утром или поздним вечером
- Использовать мягкую чистую воду с нейтральным pH и температурой не менее +10 °C

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- Проводить обработку при температуре воздуха выше +25 °C
- Обрабатывать ослабленные растения

Для достижения наилучшего результата рекомендуем применять баковую смесь четыре раза за период вегетации

КОМБИСЕТ® от вредителей и болезней на ЯГОДАХ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БАКОВОЙ СМЕСИ

ПРЕПАРАТ	ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ/ НАЗНАЧЕНИЕ	РАЗВЕДЕНИЕ, л	РАСХОД РАБОЧЕГО РАСТВОРА	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Имиприд®, 5 мл	Тля, трипсы	На 10 л воды	На 100 м²	Опрыскивание в период вегетации до цветения и после сборки урожая Интервал между обработками 14 дней
Профи®, 5 мл	Пятнистости, мучнистая роса, ржавчина, антракноз			
АгроСтимул®, 2 мл	Ускорение наступления биологической зрелости; увеличение урожайности и качества продукции			

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БАКОВОЙ СМЕСИ

1. В емкость объемом 10 л налить 5 л воды.
2. Вскрыть упаковку «ИМИПРИД®», 5 мл, открыть ампулу, вылить ее содержимое в воду, тщательно перемешать до полного растворения.
3. Вскрыть упаковку «ПРОФИ®», 5 мл, открыть ампулу, добавить концентрат эмульсии в полученный раствор и размешать до однородного состояния.
4. Вскрыть упаковку «АГРОСТИМУЛ®», 2 мл, открыть ампулу, добавить ее содержимое в полученный раствор и аккуратно размешать до однородного состояния.
5. В емкость с полученным раствором добавить воды до полного объема (10 л) и еще раз тщательно размешать до однородного состояния.
Раствор готов к применению. Использовать для обработки цветочных и декоративных культур согласно рекомендациям по использованию баковой смеси.

Финальный размер
74×100 мм

КОМБИСЕТ® от вредителей и болезней на ЯГОДАХ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БАКОВОЙ СМЕСИ

ПРЕПАРАТ	ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ/ НАЗНАЧЕНИЕ	РАЗВЕДЕНИЕ, л
Имиприд®, 5 мл	Тля, трипсы	На 10 л воды
Профи®, 5 мл	Пятнистости, мучнистая роса, ржавчина, антракноз	
АгроСтимул®, 2 мл	Ускорение наступления биологической зрелости; увеличение урожайности и качества продукции	

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БАКОВОЙ СМЕСИ

1. В емкость объемом 10 л налить 5 л воды.
2. Вскрыть упаковку «ИМИПРИД®», 5 мл, открыть ампулу, вылить ее содержимое в воду, тщательно перемешать до полного растворения.
3. Вскрыть упаковку «ПРОФИ®», 5 мл, открыть ампулу, добавить концентрат эмульсии в полученный раствор и размешать до однородного состояния.
4. Вскрыть упаковку «АГРОСТИМУЛ®», 2 мл, открыть ампулу, добавить ее содержимое в полученный раствор и аккуратно размешать до однородного состояния.
5. В емкость с полученным раствором добавить воды до полного объема (10 л) и еще раз тщательно размешать до однородного состояния.
Раствор готов к применению. Использовать для обработки цветочных и декоративных культур согласно рекомендациям по использованию баковой смеси.

Заказчик **Агрусхим-Алабуга** № макета **16-25-05-26**

Название **Инструкция Комбисет Ягоды**

Обрезной формат **148x200**

Схема фальцовки № **23** Подготовил(а) макет **Евгения Приц**

Согласовано и Утверждено _____ Подпись _____ Дата **25.05.2026**

Менеджер: **Бойцова Лилия**

Заказчик: _____

Внимание! Подпись заказчика под данным оригинал-макетом означает, что заказчик согласен с общим видом, текстом, размером, ориентацией. После утверждения заказчиком оригинал-макета типография не несет ответственности за грамматические и другие ошибки, которые могут присутствовать в оригинал-макете и отпечатанном тираже.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

КРАСОЧНОСТЬ
(допуск по цвету ΔE ≤ 3, ISO 12647-2:2004)

- Биговка
- Высечка

ДАННАЯ РАСПЕЧАТКА



НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЦВЕТОПРОБой

СХЕМА ФАЛЬЦОВКИ

Схема фальцовки