

КОМБИСЕТ® от вредителей и болезней ЦВЕТОВ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БАКОВОЙ СМЕСИ

ПРЕПАРАТ	ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ/ НАЗНАЧЕНИЕ	РАЗВЕДЕНИЕ, л	РАСХОД РАБОЧЕГО РАСТВОРА	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Имиприд®, 5 мл	Тля, трипсы	На 10 л воды	На 100 м²	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни и в начале заселения вредите- лями. Интервал между обработками 14 дней
Дискор®, 2 мл	Мучнистая роса, ржавчина, серая гниль, пятнистости			
АгроСтимул®, 2 мл	Стимуляция роста, бутонизации и пышного цветения			

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БАКОВОЙ СМЕСИ

1. В емкость объемом 10 л налить 5 л воды.
 2. Вскрыть упаковку «ИМИПРИД®, 5 мл», открыть ампулу, вылить ее содержимое в воду, тщательно перемешать до полного растворения.
 3. Вскрыть упаковку «ДИСКОР®, 2 мл», открыть ампулу, добавить ее содержимое в полученный раствор и размешать до однородного состояния.
 4. Вскрыть упаковку «АГРОСТИМУЛ®, 2 мл», открыть ампулу, добавить ее содержимое в полученный раствор и аккуратно размешать до однородного состояния.
 5. В емкость с полученным раствором добавить воды до полного объема (10 л) и еще раз тщательно размешать до однородного состояния.
- Раствор готов к применению. Использовать для обработки цветочных и декоративных культур согласно рекомендациям по использованию баковой смеси.

ЗАПРЕЩЕНО СМЕШИВАТЬ КОМПОНЕНТЫ ДАННОЙ БАКОВОЙ СМЕСИ
В ДРУГОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ!

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ



Налить 5 л
воды



Вскрыть **ИМИПРИД®**,
добавить в воду,
тщательно перемешать



Вскрыть **ДИСКОР®**,
добавить в раствор,
тщательно перемешать



Вскрыть **АГРОСТИМУЛ®**,
добавить в раствор,
тщательно перемешать



Добавить воды
до объема 10 л,
тщательно перемешать,
опрыскать растения

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ОБРАБОТКЕ БАКОВЫМИ СМЕСЯМИ

- Готовую баковую смесь следует использовать в день ее приготовления
- Обработку нужно проводить в ясную безветренную погоду при температуре от +15 до +25 °C
- Обработки проводить ранним утром или поздним вечером
- Использовать мягкую чистую воду с нейтральным pH и температурой не менее +10 °C

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- Проводить обработку при температуре воздуха выше +25 °C
 - Обрабатывать ослабленные растения
- Для достижения наилучшего результата рекомендуем применять баковую смесь четыре раза за период вегетации

Заказчик	Агрусхим-Алабуга	№ макета	15-25-05-26
Название	Инструкция Комбисет Цветы		
Обрезной формат	148x200		
Схема фальцовки №	23	Подготовил(а) макет	Евгения Приц
Согласовано и Утверждено			
Менеджер: Бойцова Лилия		Дата: 25.05.2026	
Заказчик:			
Внимание! Подпись заказчика под данным оригинал-макетом означает, что заказчик согласен с общим видом, текстом, размером, ориентацией. После утверждения заказчиком оригинал-макета типография не несет ответственности за грамматические и другие ошибки, которые могут присутствовать в оригинал-макете и отпечатанном тираже.			
ПРИМЕЧАНИЕ:			

КРАСОЧНОСТЬ (допуск по цвету ΔE ≤ 3, ISO 12647-2:2004)
 Black
ДАННАЯ РАСПЕЧАТКА

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЦВЕТОПРОБой

СХЕМА ФАЛЬЦОВКИ
Схема фальцовки на странице 2



1^й фальц
148×200 —> 148×100

2^й фальц
148×100 —> 74×100

КОМБИСЕТ® от вредителей и болезней ЦВЕТОВ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БАКОВОЙ СМЕСИ				
ПРЕПАРАТ	ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ/ НАЗНАЧЕНИЕ	РАЗВЕДЕНИЕ, л	РАСХОД РАБОЧЕГО РАСТВОРА	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Имиприд®, 5 мл	Тля, трипсы	На 10 л воды	На 100 м²	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни и в начале заселения вредителями. Интервал между обработками 14 дней
Дискор®, 2 мл	Мучнистая роса, ржавчина, серая гниль, пятнистости			
АгроСтимул®, 2 мл	Стимуляция роста, бутонизации и пышного цветения			

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БАКОВОЙ СМЕСИ
1. В емкость объемом 10 л налить 5 л воды.
2. Вскрыть упаковку «ИМИПРИД®», 5 мл, открыть ампулу, вылить ее содержимое в воду, тщательно перемешать до полного растворения.
3. Вскрыть упаковку «ДИСКОР®», 2 мл, открыть ампулу, добавить ее содержимое в полученный раствор и размешать до однородного состояния.
4. Вскрыть упаковку «АГРОСТИМУЛ®», 2 мл, открыть ампулу, добавить ее содержимое в полученный раствор и аккуратно размешать до однородного состояния.
5. В емкость с полученным раствором добавить воды до полного объема (10 л) и еще раз тщательно размешать до однородного состояния.
Раствор готов к применению. Использовать для обработки цветочных и декоративных культур согласно рекомендациям по использованию баковой смеси.

ЗАПРЕЩЕНО СМЕШИВАТЬ КОМПОНЕНТЫ ДАННОЙ БАКОВОЙ СМЕСИ

В ДРУГОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ!

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ



ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ОБРАБОТКЕ БАКОВЫМИ СМЕСЯМИ

- Готовую баковую смесь следует использовать в день ее приготовления
- Обработку нужно проводить в ясную безветренную погоду при температуре от +15 до +25 °С
- Обработки проводить ранним утром или поздним вечером
- Использовать мягкую чистую воду с нейтральным pH и температурой не менее +10 °С

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- Проводить обработку при температуре воздуха выше +25 °С
 - Обрабатывать ослабленные растения
- Для достижения наилучшего результата рекомендуем применять баковую смесь четыре раза за период вегетации

КОМБИСЕТ® от вредителей и болезней ЦВЕТОВ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БАКОВОЙ СМЕСИ				
ПРЕПАРАТ	ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ/ НАЗНАЧЕНИЕ	РАЗВЕДЕНИЕ, л	РАСХОД РАБОЧЕГО РАСТВОРА	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Имиприд®, 5 мл	Тля, трипсы	На 10 л воды	На 100 м²	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни и в начале заселения вредителями. Интервал между обработками 14 дней
Дискор®, 2 мл	Мучнистая роса, ржавчина, серая гниль, пятнистости			
АгроСтимул®, 2 мл	Стимуляция роста, бутонизации и пышного цветения			

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БАКОВОЙ СМЕСИ
1. В емкость объемом 10 л налить 5 л воды.
2. Вскрыть упаковку «ИМИПРИД®», 5 мл, открыть ампулу, вылить ее содержимое в воду, тщательно перемешать до полного растворения.
3. Вскрыть упаковку «ДИСКОР®», 2 мл, открыть ампулу, добавить ее содержимое в полученный раствор и размешать до однородного состояния.
4. Вскрыть упаковку «АГРОСТИМУЛ®», 2 мл, открыть ампулу, добавить ее содержимое в полученный раствор и аккуратно размешать до однородного состояния.
5. В емкость с полученным раствором добавить воды до полного объема (10 л) и еще раз тщательно размешать до однородного состояния.
Раствор готов к применению. Использовать для обработки цветочных и декоративных культур согласно рекомендациям по использованию баковой смеси.

ЗАПРЕЩЕНО СМЕШИВАТЬ КОМПОНЕНТЫ ДАННОЙ БАКОВОЙ СМЕСИ

Финальный размер
74×100 мм

КОМБИСЕТ® от вредителей и болезней ЦВЕТОВ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БАКОВОЙ СМЕСИ		
ПРЕПАРАТ	ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ/ НАЗНАЧЕНИЕ	РАЗВЕДЕНИЕ, л
Имиприд®, 5 мл	Тля, трипсы	На 10 л воды
Дискор®, 2 мл	Мучнистая роса, ржавчина, серая гниль, пятнистости	
АгроСтимул®, 2 мл	Стимуляция роста, бутонизации и пышного цветения	

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БАКОВОЙ СМЕСИ
1. В емкость объемом 10 л налить 5 л воды.
2. Вскрыть упаковку «ИМИПРИД®», 5 мл, открыть ампулу, вылить ее содержимое в воду, тщательно перемешать до полного растворения.
3. Вскрыть упаковку «ДИСКОР®», 2 мл, открыть ампулу, добавить ее содержимое в полученный раствор и размешать до однородного состояния.
4. Вскрыть упаковку «АГРОСТИМУЛ®», 2 мл, открыть ампулу, добавить ее содержимое в полученный раствор и аккуратно размешать до однородного состояния.
5. В емкость с полученным раствором добавить воды до полного объема (10 л) и еще раз тщательно размешать до однородного состояния.
Раствор готов к применению. Использовать для обработки цветочных и декоративных культур согласно рекомендациям по использованию баковой смеси.

ЗАПРЕЩЕНО СМЕШИВАТЬ КОМПОНЕНТЫ ДАННОЙ БАКОВОЙ СМЕСИ

Заказчик	Агрусхим-Алабуга	№ макета	15-25-05-26
Название	Инструкция Комбисет Цветы		
Обрезной формат	148x200		
Схема фальцовки №	23	Подготовил(а) макет	Евгения Приц
Согласовано и Утверждено	Подпись	Дата	
Менеджер:	Бойцова Лилия	25.05.2026	
Заказчик:			
Внимание! Подпись заказчика под данным оригинал-макетом означает, что заказчик согласен с общим видом, текстом, размером, ориентацией. После утверждения заказчиком оригинал-макета типография не несет ответственности за грамматические и другие ошибки, которые могут присутствовать в оригинал-макете и отпечатанном тираже.			
ПРИМЕЧАНИЕ:			

КРАСОЧНОСТЬ (допуск по цвету ΔE ≤ 3, ISO 12647-2:2004)	СХЕМА ФАЛЬЦОВКИ
Биговка Высечка	Схема фальцовки
ДАННАЯ РАСПЕЧАТКА	
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЦВЕТОПРОБой	