

КОМБИСЕТ® от вредителей и болезней КАРТОФЕЛЯ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БАКОВОЙ СМЕСИ

ПРЕПАРАТ	ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ/ НАЗНАЧЕНИЕ	РАЗВЕДЕНИЕ, л	РАСХОД РАБОЧЕГО РАСТВОРА	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Клотиамет®, 1 г	Колорадский жук, личинки колорадского жука	На 10 л воды	На 100 м²	Опрыскивание в период вегетации: Первое – в начале смыкания рядов Второе – в период бутонизации Третье – в конце цветения в период роста клубней
Фамокс®, 6 г	Фитофтороз, альтернариоз, выраженное профилакти- ческое и лечебное действие			
Белиф®, 3 мл	Увеличение площади покрытия и удержание рабочего раствора на поверхности листьев			

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БАКОВОЙ СМЕСИ

- В емкость объемом 10 л налить 5 л воды.
 - Вскрыть упаковку «КЛОТИАМЕТ®», 1 г», высыпать гранулы в воду, тщательно перемешать до полного растворения.
 - Вскрыть упаковку «ФАМОКС®», 6 г», добавить гранулы в полученный раствор и размешать до однородного состояния.
 - В емкость с полученным раствором добавить воды до полного объема (10 л) и еще раз тщательно размешать до однородного состояния.
 - Вскрыть упаковку «БЕЛИФ®», 3 мл», открыть ампулу, добавить жидкость в полученный раствор и аккуратно размешать до однородного состояния в течение 1–2 минут.
- Раствор готов к применению. Использовать для обработки посадок картофеля согласно рекомендациям по использованию баковой смеси.

**ЗАПРЕЩЕНО СМЕШИВАТЬ КОМПОНЕНТЫ ДАННОЙ БАКОВОЙ СМЕСИ
В ДРУГОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ!**

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ



Налить 5 л
воды



Вскрыть **КЛОТИАМЕТ®**,
добавить в воду,
тщательно перемешать



Вскрыть **ФАМОКС®**,
добавить в раствор,
тщательно перемешать



Добавить воду до
10 л, вскрыть **БЕЛИФ®**,
добавить в раствор



Аккуратно перемешать
и опрыскать растения

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ОБРАБОТКЕ БАКОВЫМИ СМЕСЯМИ

- Готовую баковую смесь следует использовать в день ее приготовления
- Обработку нужно проводить в ясную безветренную погоду при температуре от +15 до +25 °C
- Обработки проводить ранним утром или поздним вечером
- Использовать мягкую чистую воду с нейтральным pH и температурой не менее +10 °C

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- Проводить обработку при температуре воздуха выше +25 °C
 - Обрабатывать ослабленные растения
- Для достижения наилучшего результата рекомендуем применять баковую смесь четыре раза за период вегетации

Заказчик	Агрусхим-Алабуга	№ макета	12-22-05-26
Название	Инструкция Комбисет Картофель		
Обрезной формат	148x200		
Схема фальцовки №	23	Подготовил(а) макет	Евгения Приц
Согласовано и Утверждено			
Менеджер: Бойцова Лилия		Дата: 25.05.2026	
Заказчик:			
Внимание! Подпись заказчика под данным оригинал-макетом означает, что заказчик согласен с общим видом, текстом, размером, ориентацией. После утверждения заказчиком оригинал-макета типография не несет ответственности за грамматические и другие ошибки, которые могут присутствовать в оригинал-макете и отпечатанном тираже.			
ПРИМЕЧАНИЕ:			

КРАСКОСТЬ (допуск по цвету ΔE ≤ 3, ISO 12647-2:2004)	СХЕМА ФАЛЬЦОВКИ
 Black	Схема фальцовки на странице 2
ДАННАЯ РАСПЕЧАТКА	
 НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЦВЕТОПРОБой	



1^й фальц
148×200 —> 148×100

2^й фальц
148×100 —> 74×100

КОМБИСЕТ® от вредителей и болезней КАРТОФЕЛЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БАКОВОЙ СМЕСИ				
ПРЕПАРАТ	ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ/ НАЗНАЧЕНИЕ	РАЗВЕДЕНИЕ, л	РАСХОД РАБОЧЕГО РАСТВОРА	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Клотиамет®, 1 г	Копраадский жук, личинки копраадского жука	На 10 л воды	На 100 м²	Опрыскивание в период вегетации: Первое – в начале смыкания рядов Второе – в период бутонизации Третье – в конце цветения в период роста клубней
Фамокс®, 6 г	Фитофтороз, альтернариоз, выраженное профилактическое и лечебное действие			
Белиф®, 3 мл	Увеличение площади покрытия и удержание рабочего раствора на поверхности листьев			

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БАКОВОЙ СМЕСИ

- В емкость объемом 10 л налить 5 л воды.
- Вскрыть упаковку «КЛОТИАМЕТ®», 1 г», высыпать гранулы в воду, тщательно перемешать до полного растворения.
- Вскрыть упаковку «ФАМОКС®», 6 г», добавить гранулы в полученный раствор и размешать до однородного состояния.
- В емкость с полученным раствором добавить воды до полного объема (10 л) и еще раз тщательно размешать до однородного состояния.
- Вскрыть упаковку «БЕЛИФ®», 3 мл», открыть ампулу, добавить жидкость в полученный раствор и аккуратно размешать до однородного состояния в течение 1–2 минут.

Раствор готов к применению. Использовать для обработки посадок картофеля согласно рекомендациям по использованию баковой смеси.

ЗАПРЕЩЕНО СМЕШИВАТЬ КОМПОНЕНТЫ ДАННОЙ БАКОВОЙ СМЕСИ В ДРУГОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ!

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ



ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ОБРАБОТКЕ БАКОВЫМИ СМЕСЯМИ

- Готовую баковую смесь следует использовать в день ее приготовления
- Обработку нужно проводить в ясную безветренную погоду при температуре от +15 до +25 °C
- Обработки проводить ранним утром или поздним вечером
- Использовать мягкую чистую воду с нейтральным pH и температурой не менее +10 °C

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- Проводить обработку при температуре воздуха выше +25 °C
 - Обрабатывать ослабленные растения
- Для достижения наилучшего результата рекомендуем применять баковую смесь четыре раза за период вегетации

КОМБИСЕТ® от вредителей и болезней КАРТОФЕЛЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БАКОВОЙ СМЕСИ				
ПРЕПАРАТ	ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ/ НАЗНАЧЕНИЕ	РАЗВЕДЕНИЕ, л	РАСХОД РАБОЧЕГО РАСТВОРА	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Клотиамет®, 1 г	Копраадский жук, личинки копраадского жука	На 10 л воды	На 100 м²	Опрыскивание в период вегетации: Первое – в начале смыкания рядов Второе – в период бутонизации Третье – в конце цветения в период роста клубней
Фамокс®, 6 г	Фитофтороз, альтернариоз, выраженное профилактическое и лечебное действие			
Белиф®, 3 мл	Увеличение площади покрытия и удержание рабочего раствора на поверхности листьев			

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БАКОВОЙ СМЕСИ

- В емкость объемом 10 л налить 5 л воды.
- Вскрыть упаковку «КЛОТИАМЕТ®», 1 г», высыпать гранулы в воду, тщательно перемешать до полного растворения.
- Вскрыть упаковку «ФАМОКС®», 6 г», добавить гранулы в полученный раствор и размешать до однородного состояния.
- В емкость с полученным раствором добавить воды до полного объема (10 л) и еще раз тщательно размешать до однородного состояния.
- Вскрыть упаковку «БЕЛИФ®», 3 мл», открыть ампулу, добавить жидкость в полученный раствор и аккуратно размешать до однородного состояния в течение 1–2 минут.

Раствор готов к применению. Использовать для обработки посадок картофеля согласно рекомендациям по использованию баковой смеси.

Финальный размер
74×100 мм

КОМБИСЕТ® от вредителей и болезней КАРТОФЕЛЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БАКОВОЙ СМЕСИ		
ПРЕПАРАТ	ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ/ НАЗНАЧЕНИЕ	РАЗВЕДЕНИЕ, л
Клотиамет®, 1 г	Копраадский жук, личинки копраадского жука	На 10 л воды
Фамокс®, 6 г	Фитофтороз, альтернариоз, выраженное профилактическое и лечебное действие	
Белиф®, 3 мл	Увеличение площади покрытия и удержание рабочего раствора на поверхности листьев	

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БАКОВОЙ СМЕСИ

- В емкость объемом 10 л налить 5 л воды.
- Вскрыть упаковку «КЛОТИАМЕТ®», 1 г», высыпать гранулы в воду, тщательно перемешать до полного растворения.
- Вскрыть упаковку «ФАМОКС®», 6 г», добавить гранулы в полученный раствор и размешать до однородного состояния.
- В емкость с полученным раствором добавить воды до полного объема (10 л) и еще раз тщательно размешать до однородного состояния.
- Вскрыть упаковку «БЕЛИФ®», 3 мл», открыть ампулу, добавить жидкость в полученный раствор и аккуратно размешать до однородного состояния в течение 1–2 минут.

Раствор готов к применению. Использовать для обработки посадок картофеля согласно рекомендациям по использованию баковой смеси.

Заказчик	Агрусхим-Алабура	№ макета	12-22-05-26
Название	Инструкция Комбисет Картофель		
Обрезной формат	148x200		
Схема фальцовки №	23	Подготовил(а) макет	Евгения Приц
Согласовано и Утверждено	Подпись	Дата	
Менеджер:	Бойцова Лилия	25.05.2026	
Заказчик:			
Внимание! Подпись заказчика под данным оригинал-макетом означает, что заказчик согласен с общим видом, текстом, размером, ориентацией. После утверждения заказчиком оригинал-макета типография не несет ответственности за грамматические и другие ошибки, которые могут присутствовать в оригинал-макете и отпечатанном тираже.			
ПРИМЕЧАНИЕ:			

КРАСОЧНОСТЬ
(допуск по цвету ΔE ≤ 3, ISO 12647-2:2004)

- Биговка
- Высечка

СХЕМА ФАЛЬЦОВКИ

Схема фальцовки

ДАННАЯ РАСПЕЧАТКА



НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЦВЕТОПРОБой